Hexolobodon phenax

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Hexolobodon phenax — єдиний вид роду *Hexolobodon* родини Хутієвих. Мешкав на острові Гаїті. Вимер приблизно до 1600-х років[1] після прибуття європейських поселенців. Про це можна зробити висновок по тому, що їх рештки знаходять разом із рештками пацюків[2]. Розміром був приблизно з Хутію кубинську[3].

†***Hexolobodon phenax*** ?
Охоронний статус
Вимерлий (МСОП 3.1)
Біологічна класифікація
Домен: Еукаріоти (Eukaryota)
Царство: Тварини (Metazoa)
Тип: Хордові (Chordata)
Клас: Ссавці (Mammalia)
Ряд: Гризуни (Rodentia)
Підряд: Дикобразоподібні (Hystricomorpha)
Родина: Хутієві (Capromyidae)
Рід: †*Hexolobodon*
Вид: †***Hexolobodon phenax*** Miller, 1929
Посилання
EOL: **326778 (http://www.eol.org/pages/326778)**
ITIS: **584886 (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=584886)**
МСОП: **10034 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/10034)**

Виноски

1. Graeme Caughley, Anne Gunn — Conservation biology in theory and practice, 1996, P. 137
2. веб-сайт (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/10034/0) МСОП
3. Ronald M. Nowak. Walker's mammals of the world. — 1999. — Vol 1. — P. 1708

Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexolobodon_phenax&oldid=27811483

Цю сторінку востаннє відредаговано о 21:03, 27 квітня 2020.

Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike; також можуть діяти додаткові умови. Детальніше див. Умови використання.